



FEBRE AMARELA

FLUXO LABORATORIAL

ATUALIZAÇÃO: 17 DE JANEIRO DE 2025

CASO SUSPEITO

- INDIVÍDUO NÃO VACINADO CONTRA FEBRE AMARELA, OU COM ESTADO VACINAL IGNORADO, QUE APRESENTOU QUADRO INFECCIOSO FEBRIL AGUDO (GERALMENTE, ATÉ SETE DIAS), DE INÍCIO SÚBITO, ACOMPANHADO DE:
 - ICTERÍCIA; E/OU
 - MANIFESTAÇÕES HEMORRÁGICAS.
- COM DESLOCAMENTO NOS ÚLTIMOS 15 DIAS A ÁREAS DE RISCO, LOCAIS COM OCORRÊNCIA RECENTE DE EPIZOOTIA EM PNH OU ÁREAS RECÉM AFETADAS E SUAS PROXIMIDADES.

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

- PREENCHER FICHA DE NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO E INSERIR NO SINAN.

DIAGNÓSTICO

- ENVIAR AMOSTRAS AO INSTITUTO ADOLFO LUTZ COM:
 - CADASTRO NO SISTEMA GAL;
 - LISTA DE REMESSA DE AMOSTRAS; E
 - CÓPIA DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO SINAN DEVIDAMENTE PREENCHIDA.

AGRAVO	PESQUISA NO GAL	Material Biológico	Coleta, armazenamento e transporte
Caso suspeito de febre amarela	Febre Amarela	Soro: 5-10mL centrifugado	• 2° a 8°C por até 6 horas • -20°C por períodos maiores • transporte refrigerado
Óbito suspeito de febre amarela	Febre Amarela	Soro: 5-10mL centrifugado	• 2° a 8°C por até 6 horas • -20°C por períodos maiores • transporte refrigerado
	Febre Amarela	Fragmentos de órgãos (essencialmente fígado)	• Congelados em frasco plástico hermético estéril. • Transportar sob refrigeração.
	Febre Amarela Patologia	Fragmentos de órgãos	• Acondicionar em frasco de boca larga com formalina tamponada. • Manter e transportar em temperatura ambiente.